

**El TiLV  
solo afecta  
a las  
tilapias**



**No afecta  
a otras  
especies**



Somos el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, encargado de supervisar y fiscalizar todas las actividades pesqueras y acuícolas en el Perú, para que los productos hidrobiológicos y sus derivados sean sanos, inocuos y aptos para el consumo humano, en resguardo de la salud pública.

**Solicita más información  
en las oficinas de SANIPES  
de tu región**



- **TARAPOTO** » Urb. Baltazar Martínez de Compagnon Mz. A Lote 3 Tercer Piso Morales San Martín, Tarapoto, San Martín. » Tel. 042 524247
- **SECHURA** » A H Vicente Churunga Aldana Mz. B Lote 18 Sechura Piura » Tel. 073 377272
- **PAITA** » Mz. B Lote 34 2da Etapa FONAVI Urb. Isabel Barreto, Paíta, Piura. » Tel. 073 214448
- **CHIMBOTÉ** » Urb. Mansal Luzuriaga Mz. C Lote 13 Edificio Magan Tercer Piso Nuevo Chimboté, El Santa, Arecash » Tel. 043 417224
- **LIMA** » Sede Surquillo: Domingo Orué N° 165, piso 7, Surquillo Lima, Perú » Tel. 051 2138570 / Sede Callao: Carretera a Ventanilla Km. 5.2, Callao Perú » Tel. 051 7150180

Ayúdanos a controlar el TiLV. Escribe a: [enfermedadesacuaticos@sanipes.gob.pe](mailto:enfermedadesacuaticos@sanipes.gob.pe)

[www.sanipes.gob.pe](http://www.sanipes.gob.pe)

**EL PERÚ PRIMERO**



PERÚ

Ministerio  
de la Producción



**SANIPES**  
Organismo Nacional de  
Sanidad Pesquera

DIRECCIÓN REGIONAL  
DE LA PRODUCCIÓN




**Ante la  
presencia  
del Virus de  
la Tilapia  
Lacustre (TiLV)...**

**SANIPES te orienta**



El Virus de la Tilapia Lacustre (TLV) es responsable de la muerte masiva de tilapias silvestres y de cultivo en diferentes partes del mundo. SANIPES viene aplicando un plan de emergencia que incluyen acciones preventivas y de asistencia en las zonas donde se desarrolla la actividad de cultivo de esta especie.

## ¿Cómo reconocer el virus en las tilapias?



Anormalidad ocular (ojos opacos y/o exoftálmia)

Pérdida del apetito

Lesiones en la piel (úlceras)

Mortalidad atípica (entre el 20% - 90%)

Hinchazón abdominal

Nado y movimiento errático

## El Virus de la Tilapia Lacustre infecta a:



Huevos fertilizados y larvas



Alevines



Juveniles



Adultos y reproductores

## Recomendaciones para evitar y enfrentar el virus



No trasladar tilapias de un centro acuícola a otro.



Evitar la sobrepoblación de tilapias en los estanques para evitar el estrés.



Restringir las visitas al centro acuícola. En caso de ingreso, utilizar ropa descartable y calzado desinfectado.



Los materiales y equipos deben de ser de uso exclusivo y desinfectados antes y después de usar.



La mortalidad debe ser recogida diariamente y colocada en una poza con cal.



Utilizar mallas de protección en los estanques de cultivo para evitar el ingreso de animales.

## ¿Qué debes hacer si tienes mortalidad en tu centro de cultivo?

Recolecta la mortalidad diariamente y colócala en recipientes exclusivos con tapas para evitar derrames.

Considera estas opciones para la disposición final de la mortalidad:

### 1. Encalado


- Implementa una poza de mortalidad (de una profundidad mínima de 2 mt.) alejada de los estanques y/o lagunas.
- Agrega cal sobre la mortalidad (1 kg. de cal por cada 10 kg. de peces) y mantén tu poza tapada.

### 2. Incinerado

- Transporta la mortalidad en envases cerrados hasta el lugar de incineración.

### 3. Ensilado químico

- En un área exclusiva de ensilaje químico, muele la mortalidad y, por ejemplo, añádele ácido fórmico al 85% (3,5 l de ácido fórmico por cada 100 Kg. de peces) hasta alcanzar un pH de 4.



# Ante la presencia del Virus de la Tilapia Lacustre (TILV)...



Los centros acuícolas deben tomar en cuenta lo siguiente:



**No trasladar** tilapias de un centro acuícola a otro.



**Evitar la sobrepoblación de tilapias** en los estanques para evitar el estrés.



**Restringir las visitas** al centro acuícola. En caso de ingreso, utilizar ropa descartable y calzado desinfectado.



**Los materiales y equipos deben de ser de uso exclusivo** y desinfectados antes y después de usar.



**La mortalidad debe ser recogida diariamente** y colocada en una poza con cal.



**Utilizar mallas de protección en los estanques de cultivo** para evitar el ingreso de animales.

• **OD Tarapoto**  
Telf. (042)524247

• **OD Sechura**  
Telf. (073)377272

• **OD Lima**  
Surquillo: (01)2138570 /  
Callao: (01)7150180

• **OD Paita**  
Telf. (073)214448

• **OD Chimbote**  
Telf. (043)417224

Solicita más información  
en las oficinas de **SANIPES**  
de tu región



SanipesPeru



Ayúdanos a controlar el TILV.

Escríbenos a:

[enfermedades.acuaticos@sanipes.gob.pe](mailto:enfermedades.acuaticos@sanipes.gob.pe)

[www.sanipes.gob.pe](http://www.sanipes.gob.pe)



PERÚ  
Ministerio  
de la Producción



**SANIPES**  
Organismo Nacional de  
Sanidad Pesquera

**EL PERÚ PRIMERO**